



Instruções e preparos

Os exames são realizados em clientes com idade igual ou superior a 6 anos.

Suspender 12 (doze) horas antes do exame: xarope, inalação e broncodilatadores de longa ação (formoterol, salmeterol, Foraseq®, Foradil®, Symbicort®, Seretide®, Serevent®, Alenia® e Fluir®). Caso o paciente não consiga ficar 12 horas sem a medicação, ele poderá fazer uso da medicação mas deverá avisar no momento da realização do exame.

Suspender 4 (quatro) horas antes do exame: xarope, inalação e broncodilatadores de curta ação (salbutamol, fenoterol, Aerolin®, Aerojet®, Combivent®, Duovent®, Berotec®, Aero-ped®, Aerotrat®, Abulin®, Asmaliv®, Broncodil®, Broncolin®, Novosalmol®, Pneumolat®, Salbutalin®, Saltamol® e Ventolin®).

Alimentação normal sem exagero, não é necessário jejum.

Suspender 6 horas antes do exame bebida alcóolica.

Suspender 2 horas antes do exame fumo em geral.

Para mais informações sobre este exame acesse:

www.uniarmuncaopulmonar.com.br

Está lista de instruções e preparo é indicada para os seguintes exames:

- Prova de Função Pulmonar Completa
- Prova de Função Pulmonar com teste de broncodilatador
- Prova de função pulmonar com resposta ao broncodilatador
- Teste de função pulmonar com gasometria arterial
- Prova de função pulmonar com BD
- Prova de função pulmonar + Prova farmaco-dinâmica
- Prova de função pulmonar + curva fluxo-volume
- Prova função respiratória
- Prova função respiratória + curva fluxo-volume + BD
- Prova ventilatória
- Prova ventilatória com broncodilatador
- Prova ventilatória com resposta a beta 2 estimulante
- Espirometria completa
- Espirometria com teste farmaco-dinâmico
- Espirometria completa com broncodilatador
- Espirometria com curva fluxo-volume
- Espirometria + curva fluxo-volume pré e pós broncodilatador
- Espirometria com estudo dos fluxos pré e pós broncodilatador
- Espirometria simples